



Te droguer, peut te conduire au HIV/SIDA.

Alors

**penses-y avant de commencer.
avant de te piquer.
avant de partager.**

Généralités

- Plus de cinq millions de personnes, dans le monde entier, ont été contaminées par le VIH après s'être injecté de la drogue. C'est par le partage de seringues et d'aiguilles contaminées que le VIH se transmet le plus vite et le plus facilement.
- L'une des principales raisons pour lesquelles le taux d'infection à VIH dans les prisons est généralement supérieur aux moyennes nationales est que les détenus prennent de la drogue par injection (ONUDC, *Rapport mondial sur les drogues 2004*).

Chez les jeunes gens

- Plus de la moitié des nouvelles infections à VIH dans le monde se déclare chez les 15-24 ans.
- Plus d'un tiers des personnes séropositives ou atteintes par le sida ont moins de 25 ans.

- Chaque minute, ce sont six jeunes de plus qui sont contaminés par le VIH (UNICEF).

En Europe orientale et en Asie centrale

- En Europe orientale et en Asie centrale, la consommation de drogues par injection a fait que l'infection à VIH s'y est propagée plus rapidement que partout ailleurs dans le monde.
- Plus de 80 % des personnes séropositives en Europe centrale, en Europe orientale et en Asie centrale ont moins de 30 ans.

En Russie

- En Russie, on estime à 1 million le nombre de personnes séropositives; plus de 90 % d'entre elles ont été infectées par des seringues et des aiguilles contaminées.

En Iran

- En Iran, plus des deux tiers des contaminations par le VIH sont dues à l'usage de drogues par injection.



En Asie

- Au Viet Nam, l'utilisation de seringues et d'aiguilles contaminées est responsable des deux tiers des infections à VIH.
- En Chine, l'utilisation de seringues et d'aiguilles contaminées est responsable de plus de la moitié des infections par le VIH.
- L'utilisation de seringues et d'aiguilles contaminées est responsable de l'épidémie de VIH/sida qui sévit en Indonésie.
- Dans le nord-est de l'Inde, 60 % à 75 % des personnes qui s'injectent de la drogue au moyen de seringues et d'aiguilles contaminées sont infectées par le VIH.

En Europe

- L'usage de drogues par injection est responsable de plus de la moitié des infections à VIH enregistrées au Portugal en 2002 et de plus de 10 % de ces infections en Europe occidentale.

En Amérique du Nord

- En Amérique du Nord, 70 % des femmes et 56 % des hommes qui s'injectent de la drogue se prostituent pour de l'argent ou de la drogue.
- Aux États-Unis, les comportements associés à l'abus de drogues sont

aujourd'hui le principal vecteur de la propagation de l'infection à VIH (National Institute on Drug Abuse des États-Unis).

En Amérique du Sud

- Dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, la quasi-totalité des cas d'infection à VIH s'expliquent par l'utilisation de seringues et d'aiguilles contaminées ou par des rapports sexuels entre hommes.
- Au Brésil, dans certaines villes, le taux d'infection à VIH est supérieur à 60 % chez les personnes qui s'injectent de la drogue.

Chez les femmes et les jeunes femmes

- Dans les établissements pénitentiaires du Brésil, du Canada et des États-Unis, les femmes risquent davantage d'être infectées par le VIH que les hommes, bon nombre d'entre elles étant incarcérées pour usage de drogues et prostitution.
- Plus de 60 % des 15-24 ans qui sont séropositifs sont des femmes.
- En Afrique, les jeunes femmes ont 30 % plus de risques d'être infectées par le VIH que les jeunes hommes.

** Toutes ces statistiques, sauf mention contraire, sont tirées du Rapport 2004 sur l'épidémie mondiale de sida publié par ONUSIDA.*

Te droguer, peut te conduire au HIV/SIDA.