



Usar drogas é se expor ao HIV.



Pense bem

**Antes de usar.
Antes de injetar.
Antes de compartilhar
seringas.**

Panorama global

- No mundo inteiro, mais de cinco milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV por causa do uso injetável de drogas.
- Compartilhar agulhas e seringas contaminadas é uma das formas mais rápidas e fáceis para se transmitir o HIV.
- O uso de drogas injetáveis é uma das principais causas dos níveis de infecção pelo HIV em prisões, que são geralmente maiores que as médias nacionais.

(Fonte: UNODC, *Relatório Mundial Sobre Drogas 2004*)

Jovens

- Mais da metade de todos os novos casos de HIV no mundo está entre jovens de 15 a 24 anos de idade.
- Mais de um terço das pessoas com Aids tem menos de 25 anos de idade.

- Todos os dias, a cada minuto, seis pessoas jovens são infectadas pelo HIV. (Fonte: UNICEF)

Europa Oriental e Ásia Central

- O uso de drogas injetáveis na Europa Oriental e Ásia Central é responsável pela rápida transmissão do HIV nessa região do mundo.
- Mais 80% das pessoas infectadas pelo vírus HIV na Europa Oriental e Ásia Central têm menos de 30 anos de idade.

Rússia

- Na Rússia, mais de 90% dos portadores do HIV (estimados em aproximadamente um milhão de pessoas) se contaminaram usando seringas e agulhas contaminadas.

Irã

- Mais de dois terços das infecções por HIV no Irã estão relacionadas ao uso de drogas injetáveis.



Ásia

- No Vietnã, o uso de seringas e agulhas contaminadas para injeção de drogas é responsável por dois terços das infecções de HIV.
- Na Indonésia, a epidemia de HIV/Aids é potencializada pelo uso de seringas e agulhas contaminadas.
- No nordeste da Índia, a infecção por HIV entre usuários de drogas injetáveis chega a 75%.
- O uso de equipamentos contaminados é responsável por mais de 50% dos casos de HIV na China.

Europa

Uso de drogas injetáveis responde por mais de 50% dos casos relatados de HIV em Portugal no ano de 2002 e por mais de 10% das infecções de HIV na Europa Ocidental.

América do Norte

- Na América do Norte, 70% das mulheres e 56% dos homens usuários de drogas injetáveis já praticaram relações sexuais em troca de dinheiro ou drogas.
- Comportamentos de risco associados ao uso abusivo de drogas são, atualmente, o maior fator isolado no avanço do HIV nos Estados Unidos. (Fonte: Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, Estados Unidos)

América do Sul

- Na maioria dos países sul-americanos, quase todas as infecções pelo HIV são causadas pelo uso de seringas e agulhas contaminadas ou por relações sexuais entre homens.
- No Brasil, níveis de infecção pelo HIV acima de 60% são relatados entre usuários de drogas injetáveis em algumas cidades.

Mulheres e meninas

- Mulheres presidiárias no Brasil, Canadá e Estados Unidos estão mais expostas à infecção pelo HIV do que homens na mesma situação. Isso se deve ao fato de que muitas dessas mulheres estão presas por crimes relacionados ao uso de drogas ou devido a atividades de prostituição.
- Mulheres jovens atualmente representam mais de 60% de toda população entre 15 e 24 anos vivendo com HIV/Aids.
- Jovens africanas têm 30% a mais de chance de serem infectadas pelo HIV do que jovens africanos.

* Todas as informações, quando não especificadas, são do *Relatório sobre Epidemia Global de Aids*, publicado pelo UNAIDS (2004).