



El consumo de drogas te expone al VIH/SIDA

Piénsalo antes de probarlas. antes de inyectarte. antes de compartirlas.

Datos generales

- Más de 5 millones de personas, a nivel mundial, han contraído el VIH como consecuencia del consumo de drogas inyectables.
- Una de las formas más rápidas y fáciles de transmisión del VIH es el uso compartido de agujas y jeringas contaminadas.
- El consumo de drogas inyectables es una de las principales razones por las que las tasas de infección del VIH en las cárceles son en general más altas que la media a nivel nacional. (ONUDD, *Informe Mundial sobre las Drogas, 2004*).

Los jóvenes

- Más de la mitad de todos los nuevos casos de infección del VIH a nivel mundial afecta a las personas de entre 15 y 24 años.
- Más de una tercera parte de todas las personas que han contraído el VIH/SIDA tiene menos de 25 años.

- En cada minuto, todos los días, seis jóvenes contraen el VIH. (UNICEF).

Europa oriental y Asia central

- El contagio entre los consumidores de drogas inyectables es la causa de la difusión más rápida, a nivel mundial, de la infección del VIH, como se observa en Europa oriental y el Asia central.
- Más del 80% de las personas que han contraído el VIH en Europa oriental y el Asia central tiene menos de 30 años.

Rusia

- En Rusia, más del 90% del millón de personas que, según se estima, han contraído el VIH, se infectó por usar equipo para inyecciones contaminado.

República Islámica del Irán

- Más de las dos terceras partes de los casos de infección por el VIH en la República Islámica del Irán se deben al consumo de drogas inyectables.



Asia

- En Viet Nam, el uso de equipo para inyecciones contaminado es la causa de las dos terceras partes de los casos de infección por el VIH.
- El uso de equipo para inyecciones contaminado es la causa de más del 50% de los casos de infección por el VIH en China.
- La epidemia del VIH/SIDA en Indonesia se debe sobre todo al uso de equipo para inyecciones contaminado.
- En la zona nororiental de la India, el nivel de infección por el VIH entre los consumidores de drogas inyectables que usaban equipo para inyecciones contaminado ha sido de un 60% a un 75%.

Europa

- El consumo de drogas inyectables ocasionó más del 50% de los casos de infección por el VIH sobre los que se informó en Portugal en 2002 y más del 10% de los casos de infección por el VIH en Europa occidental.

América del Norte

- El 70% de las mujeres y el 56% de los hombres que consumen drogas inyectables en América del Norte se han dedicado al comercio sexual a cambio de dinero o drogas.
- El comportamiento vinculado con el uso indebido de drogas es actualmente el factor más importante en la difusión de la infección por el

VIH en los Estados Unidos.
(Instituto Nacional contra la Drogadicción, Estados Unidos).

América del Sur

- Casi todas las infecciones en la mayor parte de los países de América del Sur se deben al uso de equipo para drogas inyectables contaminado o a las relaciones sexuales entre hombres.
- En algunas ciudades del Brasil, se ha informado sobre niveles de infección por el VIH de más de un 60% entre los consumidores de drogas inyectables.

Las mujeres y las niñas

- Las probabilidades de haber contraído el VIH son mayores entre las mujeres en las cárceles del Brasil, el Canadá y los Estados Unidos que entre sus contrapartes de sexo masculino, porque una alta proporción de mujeres está en prisión por su consumo de drogas o por haberse dedicado a la prostitución.
- Actualmente, las jóvenes constituyen más del 60% de todas las personas de 15 a 24 años que han contraído el VIH/SIDA.
- Las probabilidades de contraer el VIH entre las jóvenes de África son un 30% mayores que las de los jóvenes de ese continente.

* Todos los datos provienen del *Informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA 2004*, publicado por ONUSIDA, a menos que se indique otra cosa