



COVID-19 PREVENÇÃO, TRATAMENTO, CUIDADOS DE HIV E APOIO ÀS PESSOAS QUE CONSOMEM DROGAS¹

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo coronavírus recentemente descoberto



Como se espalha a COVID-19?

As pessoas podem adquirir a COVID-19 de outros que têm o vírus. A doença pode propagar-se de pessoa para pessoa através de pequenas gotículas do nariz ou da boca que são espalhadas quando uma pessoa com COVID-19 tosse ou exala.

Outras pessoas podem então adquirir COVID-19 tocando em objectos ou superfícies, tocando depois nos seus olhos, nariz ou boca. As pessoas também podem adquirir COVID-19 se respirarem gotículas de uma pessoa com COVID-19 que tosse ou exala gotículas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a avaliar a investigação em curso sobre as formas de propagação da COVID-19. Para obter as informações mais recentes, consulte <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

Para muitas pessoas, a infecção pela COVID-19 pode ser ligeira e recuperam plenamente com um mínimo de intervenção. No entanto, pode ser muito mais grave para as pessoas com condições de saúde subjacentes e para as pessoas com sistemas imunitários debilitados.



Quais são os sintomas da COVID-19?

Os principais sintomas parecem ser a gripe ou uma constipação muito grave:

- Febre
- Tosse
- Falta de ar / dificuldade em respirar

Prestação de serviços abrangentes em matéria de HIV para e com pessoas que usam drogas durante o surto da COVID-19

O PAPEL DAS COMUNIDADES É ESSENCIAL EM TODAS AS MEDIDAS DE RESPOSTA

01

As pessoas que usam drogas podem ser particularmente vulneráveis à COVID-19 devido a questões de saúde subjacentes, estigma, marginalização social e a uma maior vulnerabilidade económica e social, incluindo a falta de acesso à habitação e aos cuidados de saúde.

03

A continuidade e a sustentabilidade de serviços abrangentes de HIV, HCV e outros serviços de baixo limiar para pessoas que consomem drogas devem ser asseguradas durante a epidemia de COVID-19.

05

Os serviços abrangentes de HIV, HCV e outros serviços de baixo limiar para pessoas que consomem drogas devem estabelecer um ambiente de trabalho seguro.

02

As pessoas têm direito à saúde, mesmo em países sob regime de isolamento ou onde o estado de emergência foi declarado. Isso inclui o acesso aos serviços e programas de redução global dos danos causados pelo HIV que salvam vidas.

04

O encerramento dos serviços apenas resultará na sobrelocação dos que permanecem abertos, que aumentará o risco de transmissão e o impacto sobre a qualidade do serviço.

06

Deve ser disponibilizado um financiamento adequado.